

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Сустилак

Торговое название препарата: Сустилак

Международное непатентованное название: глюкозамин

Лекарственная форма: таблетки модифицированного высвобождения, покрытые пленочной оболочкой.

Регистрационный номер: ЛП-001838

Состав

1 таблетка модифицированного высвобождения, покрытая пленочной оболочкой, содержит:

Действующее вещество: глюкозамина гидрохлорид – 1500,00 мг.

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат – 62,00 мг, гипромеллоза (К200М) – 40,00 мг, повидон К90 – 40,00 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 83,00 мг, гипромеллоза (К100М) – 80,00 мг, кремния диоксид коллоидный – 5,00 мг, стеариновая кислота – 40,00 мг.

Оболочка: гипромеллоза Е-5 – 20,00 мг, макрогол-6000 – 6,00 мг, опадрай белый ОУ 58900 (титана диоксид, макрогол, гипромеллоза) – 11,00 мг.

Описание

Оральные таблетки белого или почти белого цвета, покрытые пленочной оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор.

Код АТХ: М01АХ05

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Глюкозамин способствует предотвращению процессов разрушения хряща, стимулирует восстановление хрящевой ткани, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, нормализует продукцию внутрисуставной жидкости. Улучшает подвижность суставов, уменьшает потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП).

Фармакокинетика

После приема внутрь быстро и полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте; пролонгированная форма обеспечивает непрерывное высвобождение активного вещества и его равномерную абсорбцию; биодоступность глюкозамина после приема внутрь составляет 25- 26% (эффект "первичного прохождения" через печень). После распределения в тканях наибольшие концентрации наблюдаются в печени, почках и хрящевой ткани.

Метаболизируется до воды, углекислого газа и мочевины.

Выводится в основном почками.

Показания к применению

Остеоартроз периферических суставов и позвоночника.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к глюкозамину и другим компонентам препарата, тяжелые нарушения функции почек, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью

бронхиальная астма, сахарный диабет, непереносимость морепродуктов (креветки, моллюски).

Способ применения и дозы

Внутрь. Принимают по 1 таблетке 1 раз в сутки, таблетки проглатывают целиком, запивая водой, в течение 6-12 недель.

По рекомендации врача курс лечения повторяют с интервалом в 2 месяца.

Устойчивый лечебный эффект достигается при приеме препарата в течение 6 месяцев.

Побочное действие

Переносимость препарата хорошая, в отдельных случаях возможны: нарушения функции желудочно-кишечного тракта (боли в эпигастрии, метеоризм, запор или диарея, тошнота; кожные аллергические реакции (крапивница, кожный зуд).

Передозировка

Симптомы: случаи передозировки неизвестны.

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Повышает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает действие полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола. Препарат совместим с парацетамолом, НПВП и глюкокортикостероидами. При совместном применении с НПВП усиливает противовоспалительный и обезболивающий эффект последних.

Особые указания

Риск аллергических реакций возрастает при непереносимости морепродуктов.

Нет ограничений относительно управление автотранспортом и сложными механизмами в период применения препарата.

Форма выпуска

Таблетки модифицированного высвобождения, покрытые пленочной оболочкой 1500 мг.

По 15 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ и фольги алюминиевой.

По 4 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «РЕМЕДИЯ» 123242, г. Москва, Дружинниковская ул., дом 13 подвал, помещение I, комната I
Тел. +7 (495) 981-94-19

Производитель

Селебрити Биофарма Лтд. Деревня Панга Джармаджри Хилл Топ Эстейт Бадди, район Солан [Эйч.Пи.], Индия.

Адрес представительства/организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «РЕМЕДИЯ» 123242, г. Москва, Дружинниковская ул., дом 13 подвал, помещение I, комната I
Тел. +7 (495) 981-94-19